



Agaric auguste



**Agaric auguste
(Agaric impérial)
Agaricus augustus**

**Division : basidiomycètes
Classe : agaricomycetidae**

L'ESSENTIEL :

Grand champignon qui pousse du début de l'été à la fin de l'automne en lisière de feuillus et conifères. Son chapeau squamulé de brun sur fond crème et la taille de son pied son typiques.

CHAPEAU :

Jusqu'à 15 cm, convexe et charnu. Il est nettement squamuleux de roux sur fond blanc crème à ocracé jaunâtre. La marge est appendiculée (un reste de voile déchiré peut rester sur les bords). Le chapeau s'étale de façon spectaculaire à maturité.

DESSOUS :

Lames très fines, serrées, libres. Elles sont crèmes grisâtres, puis rosées et enfin brun sale ou chocolat.

PIED :

Le pied peut-être de taille impressionnante, jusqu'à 20 cm. Il est cylindro-clavé et bulbeux à sa base. Blanc, légèrement floconneux sur le dessous. La base du pied est jaunissante, parfois rosissante.

Présence d'un anneau ample, évasé qui peut disparaître partiellement à maturité.

EXHALATION :

Odeur d'amandes amères et quelques fois anisée.

CHAIR :

Très bon comestible. Sa chair est blanche et fine, tendance au jaunissement sous la pression ou roussâtre à la coupe en vieillissant.

BIOTOPE :

Bois de feuillus et conifères. Il préfère les stations aérées en lisière.

RISQUE DE CONFUSION :

Agaric sylvatique qui pousse principalement sous les conifères.

Agaric champêtre ou rosé des prés, pourtant blanc et plus trapu.

Bonne cueillette !

➔ Une fiche de [eveliotis](#), membre JDN

➔ [Pour en parler](#) sur le forum JDN